



Lauch oder Porree

Allium porrum

Aussaatzzeit: Februar–April für Sommer–Herbsternte, Winter-Porree April–Mai

Keimtemperatur: min. 8°C

Abstand: ca. 20 Pflanzen / qm

Tipp: Winterporree etwas Anhäufeln zur Qualitätsverbesserung

Verwendung: Hoher Vitamin C und Eisengehalt

15g/100 m², TKG: ca. 2,5–3,5g, 1g = ca. 300–400 Korn

Belton F1	1 später Herbstporree mit robustem, sehr dunkelgrünem, steil aufrechtem Laub. Lange Feldhaltbarkeit.	4169
Blaugrüner Winter	dunkles Laub, für Herbst- und Winterernte	0162
Blaugrüner Winter Eskimo	2 winterhart, Ernte bis in den Frühling, dunkle Blätter, sehr haltbar	0562



Sellerie

Apium graveolens

Aussaatzzeit: Januar–März

Keimtemperatur: opt. 17–20°C Bodentemperatur

Abstand: ca. 15 Pflanzen / qm

Tipp: Bei Verfrühung Mindesttemperatur von 18°C beachten, sonst Gefahr der Schosserbildung, für kleinere Knollen engere Pflanzung zu empfehlen

Verwendung: für Salate, Suppenwürze, Fleischgerichte. Frische Blätter enthalten mehr Mineralstoffe + Vitamine als die Knollen

50–60g/100 m², TKG: ca. 0,4–0,6g, 1g = ca. 1.500–2.500 Korn

Knollensellerie Ibis	3 mit dem Nussgeschmack, große Knollen mit weißem Fleisch	1918
Schnittsellerie	gewöhnliche Schnitt, aromatischer	0195
Bleich-Stangensellerie	4 weißer, selbstbleichend, kräftiger Wuchs	0546
Spartacus F1	5 Frühreifender und aufrechtwachsender Stangen- oder Bleichsellerie mit geringer Schosneigung und robust gegenüber Krankheiten.	4154